

Infecção escolar de risco e Período de Suspensão

がっこうかんせんしょう しゅつぎきていしきかん
学校感染症とその出席停止期間

classificação	Tipo de infecção	Critério sobre o período de suspensão
Tipo 1	<ul style="list-style-type: none"> • Virus de Ebola (<i>ebola shukketsunetsu</i>), • crimea (<i>Kurimia</i>) • virus de Congo (<i>Congo shukkestsunetsu</i>) • (<i>tousou</i>) • virus de sudamérica (<i>Nambei Shukketsunetsu</i>) • peste (<i>pesuto</i>) • Vireola (<i>Tousou</i>) • Doença de Marburg (<i>Maruburugu Byou</i>) • Febre de Lassa (<i>Rassa netsu</i>) • Poliomielitis (<i>Kyusei Haishiro Zuinoho</i>) • Difteria • Síndrome respiratória aguda severa • Síndrome respiratoria do Oriente Medio • Influenza Avial (<i>Tokutei tori Influenza</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Até que se cure</u>
Tipo 2	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza (exceto Influenza Avial) • Coqueluche (<i>hyakuniti seki</i>) • Sarampo (<i>mashin / hashika</i>) • Caxumba (<i>otafukukaze</i>) • Rubéola (<i>fushin / mikka hashika</i>) • Catapora (<i>mizubousou</i>) • Febre faringoconjuntivite (Febre de piscina “<i>puuru netsu</i>”) • Tuberculose, <u>meningite meningocócica</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Até decorrer 5 dias após a infecção e 2 dias (em caso de criança pequena 3 dias) após a febre ter abaixado.</u> • <u>Até a tosse característica desaparecer, ou até o tratamento adequado baseado na fórmula de substancia antibacteriana de 5 dias finalizar.</u> • Até decorrer 3 dias após a febre ter abaixado. • <u>Até decorrer 5 dias após a descoberta do inchaço da parótida, glândula submandibular ou glândula sublingual e/ou o estado geral ficar favorável.</u> • Até o desaparecimento de exantemas (manchas vermelhas). • Até que toda as feridas formem uma crosta e sequem. • Até decorrer 2 dias após o desaparecimento do sintoma principal. • Dependendo da doença poderá voltar a escola quando o médico da escola ou outro médico diagnosticar que não há mais risco de contágio.
	<p>※No entanto, quando diagnosticado a doença infecciosa do tipo 2, com exceção da tuberculose, <u>meningite meningocócica</u>, e se o médico da escola ou outro médico diagnosticar que não há nenhum risco de infecção, tal não se aplica.</p>	
Tipo 3	<ul style="list-style-type: none"> • Cólera • shigelosis (<i>Saikin sesekiri</i>) • Infecção enterohemorrágica E. Coli • Febre tifoidea • Paratifoidea • epidemia queratoconjuntivite • Conjuntivite Epidémica Aguda Hemorrágica • entre outras infecções . 	<ul style="list-style-type: none"> • Até que o médico especialista decida que não tenha risco de contágio.

[Referência] Em relação a Influenza, poderá ir à escola após no mínimo 6 dias após contraído a gripe.

